

## Altre novità non commentate

### IN TERRITORIO

#### Etoricoxib

Coxib – M01AH05

Algix® IST. GENTILI

7 cpr riv 30 mg - € 8,32

Arcoxia® MERCK SHARP & DOHME

7 cpr riv 30 mg - € 8,32

28 cpr riv 30 mg - € 33,28

Tauxib® ADDENDA PHARMA

28 cpr riv 30 mg - € 33,28

Classe C - Tipo ricetta: RR

Procedura di registrazione: mutuo riconoscimento

#### Indicazioni

Per il trattamento sintomatico dell'osteoartrosi (OA), dell'artrite reumatoide (AR), della spondilite anchilosante e del dolore e dei segni di infiammazione associati all'artrite gottosa acuta.

#### Nuovo dosaggio di principio attivo

Il dosaggio inferiore di etoricoxib affianca le compresse da 60, 90, e 120 mg, per le quali era già prevista la somministrazione di 30 mg in monosomministrazione giornaliera per l'osteoartrosi.

#### Buflomedil

Vasodilatatori periferici – C04AX20

Buflocit® CT LAB FARMACEUTICO

20 cps 150 mg - € 4,13

Classe C - Tipo ricetta: non ripetibile

Procedura di registrazione: nazionale

#### Indicazioni

Trattamento sintomatico della malattia vascolare periferica cronica (stadio 2), claudicatio intermittens, in aggiunta ad un altro trattamento medico adeguato, compresa la terapia antiaggregante piastrinica.

#### Nuovo dosaggio di principio attivo

Il nuovo dosaggio di buflomedil da 150 mg si affianca alle compresse da 600 mg in commercio dal 2004. La posologia prevista da scheda tecnica è di 300-600 mg/die in dosi suddivise.

#### Ferriprotinato

Preparati a base di ferro – B03AB09

Stratofer® CHEMI

os solz 10 fl 1.200 mg - € 18,75

Classe C - Tipo ricetta: ripetibile

Procedura di registrazione: nazionale

#### Indicazioni

Trattamento degli stati di carenza di Ferro assoluta o relativa: anemie sideropeniche latenti o conclamate, dell'infanzia e dell'età adulta, dovute a deficiente apporto o assorbimento di Ferro, secondarie a emorragie acute o croniche oppure a malattie infettive, gravidanza, allattamento.

#### Nuovo dosaggio di principio attivo

E' in commercio ferriprotinato in soluzione orale da 1.200 mg, che aveva già ricevuto l'AIC nel 1993, ma mai commercializzato finora. La nuova formulazione mantiene le stesse indicazioni e posologia del prodotto già in commercio a base di ferriprotinato.

#### Fitomenadione

Vitamina K – B02BA01

Konaktion® ROCHE

iniett os 3 fl 10 mg/ml 1 ml - € 1,86

iniett os 5 fl 2 mg/0,2 ml - € 4,13

Classe A - Tipo ricetta: ripetibile

Procedura di registrazione: nazionale

#### Indicazioni

- 10 mg/ml orale e iniettabile:

emorragie o pericolo di emorragie da "ipoprotrombinemia" (deficit di fattori della coagulazione II, VII, IX e X) provocata da iperdosaggio di anticoagulanti dicumarolici, dalla loro associazione con fenilbutazone, da un'ipovitaminosi K di varia origine (ittero da occlusione, affezioni epatiche o intestinali, trattamenti prolungati con antibiotici, sulfamidici, salicilati).

- 2 mg/0,2 ml (prima infanzia) orale e iniettabile: profilassi e trattamento della sindrome emorragica neonatale (deficit di fattori della coagulazione II, VII, IX e X).

#### Nuova formulazione di principio attivo

Le fiale, fino ad oggi da utilizzare come iniettabile per via im, sono attualmente somministrabili anche per via orale, alle stesse dosi.

#### Losartan

Antagonisti dell'angiotensina II, non associati – C09CA01

Lortaan® MERCK SHARP & DOHME

os sosp 2,5 mg/ml 200 ml - € 82,06

Classe C - Tipo ricetta: ripetibile

Procedura di registrazione: mutuo riconoscimento

#### Indicazioni

- Trattamento dell'ipertensione essenziale in adulti e in bambini e adolescenti di età compresa tra 6 e 18 anni.
- Trattamento della patologia renale in pazienti adulti con ipertensione e diabete mellito di tipo 2 con proteinuria • 0,5 g/die nel contesto di una terapia antiipertensiva.
- Trattamento dell'insufficienza cardiaca cronica (in pazienti • 60 anni), quando il trattamento con gli inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina (ACE) non è considerato adatto a causa di incompatibilità, specialmente tosse, o controindicazione. I pazienti con insufficienza cardiaca che sono stabilizzati con un ACE inibitore non devono passare ad una terapia con losartan. I pazienti devono avere una frazione di eiezione del ventricolo sinistro • 40 % e devono essere clinicamente stabili ed in regime di trattamento dell'insufficienza cardiaca cronica stabilizzato.
- Riduzione del rischio di ictus in pazienti adulti ipertesi con ipertrofia ventricolare sinistra documentata con ECG

#### Nuova formulazione di principio attivo

La nuova formulazione orale di losartan (sospensione), presenta le stesse indicazioni e lo stesso regime posologico delle compresse da 100 mg già presenti sul mercato dal 2008.

## Octocog alfa

Fattori della coagulazione – B02BD02

Advate® Baxter

1 fl 3.000 UI polv + 1 fl solv - € 3.713,42

Classe A - Tipo ricetta: ripetibile

Procedura di registrazione: centralizzata europea

### Indicazioni

Trattamento e profilassi di episodi emorragici in pazienti affetti da emofilia A (deficit congenito di fattore VIII).

Il prodotto non contiene fattore von Willebrand in quantità farmacologicamente efficace e pertanto non è indicato nel trattamento della malattia di von Willebrand.

### Nuovo dosaggio di principio attivo

Il nuovo dosaggio di octocog alfa da 3.000 UI, va affiancarsi a quanto già esistente, ossia alle confezioni con vari dosaggi, che variano da 250 UI a 2.000 UI. Le indicazioni rimangono uguali, come pure la posologia, che viene calcolata in base

al grado dell'emorragia o al tipo di procedura chirurgica ed è correlata al peso corporeo del paziente.

## Rifaximina

Antibiotici per uso topico – D06AX11

Redactiv® ALFA WASSERMANN

crema 5% 30 g - € 13,00

Classe C - Tipo ricetta: ripetibile

Procedura di registrazione: nazionale

### Indicazioni

Infezioni cutanee da germi piogeni sensibili alla rifaximina: impetigine contagiosa, intertrigine, ectima, follicolite, foruncolo, cheilite angolare, idrosoadenite, eritrasma.

### Nuova formulazione di principio attivo

Rifaximina crema era commercializzabile fino al 2000, anno in cui è stato sospeso l'AIC. Ora è nuovamente disponibile in commercio.

## Solifenacina

Antispastici urinari – G04BD08

Vesiken® ASTELLAS PHARMA

10 cpr 10 mg - € 24,30

Classe C - Tipo ricetta: ripetibile

Procedura di registrazione: mutuo riconoscimento

### Indicazioni

Trattamento sintomatico dell'incontinenza da urgenza e/o aumento della frequenza urinaria e dell'urgenza che si possono verificare in pazienti con sindrome della vescica iperattiva.

### Nuovo dosaggio di principio attivo

La dose raccomandata di solifenacina è di 5 mg 1 volta/die. Se necessario, la dose può essere aumentata a 10 mg 1 volta/die. Pertanto le nuove compresse, che affiancano quelle da 5 mg, permetterebbero un miglior adeguamento posologico in pazienti che utilizzano la dose massima di farmaco.

## Valsartan

Antagonisti dell'angiotensina II, non associati – C09CA03

Tareg® NOVARTIS FARMA

Valpression® MENARINI

28 cpr riv 320 mg - € 33,16

Classe A - Tipo ricetta: ripetibile

Procedura di registrazione: nazionale

### Indicazioni

Trattamento dell'ipertensione arteriosa essenziale.

### Nuovo dosaggio di principio attivo

Il nuovo dosaggio di valsartan, 320 mg, è superiore a quanto già in commercio, ossia alle compresse da 40, 80 e 160 mg. Tale dosaggio rappresenta però la dose massima già prevista per il trattamento dell'ipertensione.

A differenza delle compresse a dosaggio più basso, il suo uso non è però indicato per il trattamento dell'infarto miocardico recente e dell'insufficienza cardiaca.

## IN OSPEDALE

### <sup>13</sup>C-Urea

Diagnostici – V04CX

Helicokit® ITALCHIMICI

2 cpr 37,5 mg - € 19,24\* - € 17,37\*\*

Classe H - Tipo ricetta: RR

Procedura di registrazione: nazionale

### Indicazioni

Medicinale solo per uso diagnostico, per la diagnosi in vivo di infezione gastroduodenale da Helicobacter pylori.

### Nuovo dosaggio di principio attivo

Le compresse di <sup>13</sup>C-Urea attualmente entrate in commercio hanno una dose dimezzata rispetto a quanto già disponibile.

La posologia rimane la stessa: 1 cpr da 75 mg solubile disciolta in 30 ml di acqua oppure 2 cpr da 37,5 mg da ingerire assieme con un sorso d'acqua.